



# ООО «Институт детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки»

РФ 143397 г. Москва, п. Первомайское, дер. Пучково, ул. Светлая, д. 6  
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-77-01-011150 от 29.10.2015

[WWW.EPILEPTOLOGIST.RU](http://WWW.EPILEPTOLOGIST.RU)

ИНН/КПП 5030070639/775101001,

ОГРН 1105030002142

20 07 2016 года

## Консультативный амбулаторный прием

**ФИО пациента, возраст:** Мамедов Ренат, 21.11.2013 г.р.

**Диагноз:** ДЦП, спастико-гиперкинетическая форма. Дистонические атаки.

**Симптоматическая фокальная эпилепсия, медикаментозная ремиссия. Ухудшение на ЭЭГ.**

**Приступы:** в неонатальном периоде.

*Из анамнеза: повторная беременность на фоне УПБ, 1 роды на 28 нед, кесарево сечение, 2-ой из тройни. Вес при рождении 1070, рост 37 см. Ангар 5/7 б. Получил курс интенсивной реабилитации с выраженной положительной динамикой: снизился гипертонус, улучшился контроль головы; хват непроизвольный. Вес 9 кг.*

**Неврологический статус:** окр. головы 44 см. ЧН: фотопреакции живые. Отмечаются гиперкинезы в виде заведения глаз вверх. Язык по средней линии, дистоничен. Саливация усиlena. В двигательной сфере: мышечный тонус повышен, положительные нейрорентгенологические тесты, аддукторный спазм. Кисть раскрыта.

**ДВЭМ (07.2016):** мультирегиональная эпилептиформная активность с акцентом в затылочных отделах, с нарастанием во вне до 80%.

**МРТ головного мозга:** корково-подкорковая атрофия.

**Рекомендации:**

1. Конвулекс 9 кап x 3 раза в день – длительно, повторный ДВЭМ через 4 мес.
2. Учитывая нарастание индекса эпилептиформной активности до вероятного рецидива эпилептических приступов, на фоне приема конвулекса в суточной дозе 30мг/кг/Сут, рекомендуется добавить леветирацетам. Препарат推薦ован по жизненным показаниям и замене не подлежит.

Леветирацетам раствор начать по схеме: 1 мл x 2 раза в день – 14 дней, 2 мл x 2 раза в день – 14 дней, 3 мл x 2 раза в день – длительно,

3. Войта-, бобат, терапия. ЛФК по методу Сандакова - гашение тонических рефлексов, гашение гиперкинезов; формирование поворотов, массаж. Логомассаж.

4. Фенибут 250 мг ½ т вечером – 1 мес. Магне В6 жидкий 10 мл утром пить натощак – 30 дней. Элькар 30% 15 капель x 3 раза в день – 1 мес пить, 1 мес перерыв. Неврохель

1 т x 4 раза в день + спаскупрель 1 т x 4 раза в день – 2 мес. + 7 (495) 181-31-01

+ 7 (495) 394-82-52

+ 7 (495) 669-83-93

+ 7 (495) 972-80-46

**EMAIL:** [center@epileptologist.ru](mailto:center@epileptologist.ru) **WEB:** [www.epileptologist.ru](http://www.epileptologist.ru)



к.м.н. доцент Бобылова М.Ю.